

WAT JE MOET WETEN OVER Anafylaxie

Wat is het?




Anafylaxie, uitgesproken als an-aa-fie-LAK-sie is de ernstigste allergische reactie die je kunt hebben

De reactie komt meestal snel, beïnvloedt je hele lichaam en kan levensbedreigend zijn



Je moet direct medische hulp en behandeling krijgen

Mogelijke symptomen bij anafylaxie




Veelvoorkomende triggers



Insectengifallergie



Medicijnenallergie



Voedselallergie



Latex-allergie

Feiten en cijfers

5%

Anafylaxie komt bij ongeveer 5% van de mensen voor in hun leven

Volgens een studie is de kans op een nieuwe anafylactische aanval 1 op 12 jaar

1/12

0.26%

Anafylaxie is de reden van 0,26% van alle ziekenhuisopnames

Extreme kou, stress, alcohol, hormonale veranderingen en lichaamsbeweging kunnen bijdragen aan de oorzaak



Hoe ga je om met anafylaxie?



1 Vermijd allergietriggers



2 Draag standaard 2 adrenaline-autoinjectoren of 2 adrenaline-neussprays bij je



3 Vraag je huisarts of allergiespecialist naar de behandel-mogelijkheden.

Wat doe je bij een noodgeval?



1

Gebruik je adrenaline-autoinjector of je adrenaline-neusspray

2

Bel 112 en vraag om een ambulance. Kan je dit niet zelf, laat een omstander bellen.

3

Wacht 5-15 minuten en dien een tweede dosis toe als dat nodig is

4


Ga altijd naar het ziekenhuis; er kan een vertraagde reactie komen.

WAT JE MOET WETEN OVER Anafylaxie

Wat is het?



Anafylaxie, uitgesproken als an-aa-fie-LAK-sie is de ernstigste allergische reactie die je kunt hebben




De reactie komt meestal snel, beïnvloedt je hele lichaam en kan levensbedreigend zijn




Je moet direct medische hulp en behandeling krijgen

Mogelijke symptomen bij anafylaxie




Veelvoorkomende triggers



Insectengifallergie



Medicijnenallergie



Voedselallergie



Latex-allergie

Feiten en cijfers

5%

Anafylaxie komt bij ongeveer 5% van de mensen voor in hun leven

1/12

Volgens een studie is de kans op een nieuwe anafylactische aanval 1 op 12 jaar


Anafylaxie is de reden van 0,26% aan alle ziekenhuisopnames

0.26%

Extreme kou, stress, alcohol, hormonale veranderingen en lichaamsbeweging kunnen bijdragen aan de oorzaak



Hoe ga je om met anafylaxie?



1 Vermijd allergietriggers



2 Draag standaard 2 adrenaline-autoinjectoren of 2 adrenaline-neussprays bij je



3 Vraag je huisarts of allergiespecialist naar de behandel-mogelijkheden

Wat doe je bij een noodgeval?



- 1 Gebruik je adrenaline-autoinjector of je adrenaline-neusspray
- 2 Bel 112 en vraag om een ambulance. Kan je dit niet zelf, laat een omstander bellen.
- 3 Wacht 5-15 minuten en dien een tweede dosis toe als dat nodig is
- 4 Ga altijd naar het ziekenhuis; er kan een vertraagde reactie komen.

